



**NEST  
BESCHERMERS**  
zorgen dat nesten  
makkelijk te zien zijn  
en niet worden  
vertrapt

Scholeksters zijn  
**PLAATSTROUW**  
dus keren jaarlijks  
terug naar  
dezelfde plek

Een  
flauw aflopende  
**SLOOTKANT**  
helpt kuikens om  
veilig voedsel  
te vinden

Een  
**BROEDPAAL**  
biedt bescherming  
tegen predatie,  
maaimachines en  
verstoring

**KRUIDENRIJK  
GRASLAND**  
trekt insecten  
aan en biedt  
beschutting

Een **GEZONDE  
BODEM** zit vol  
met voedsel zoals  
regenwormen





foto: Roy de Haas/Agami

#### HANDIGE WEETJES

- Schouksters broeden 24 tot 27 dagen.
- Het broedseizoen duurt van ongeveer maart tot augustus, met veel variatie tussen broedparen en locaties.
- Daaraan voorafgaand verkennen broedparen hun vaste nestplek.
- Schouksters keren terug naar dezelfde plek om te broeden, zolang deze geschikt is.
- Kuikens zijn na 28 dagen vliegvlug.
- Schouksters overwinteren in onze kustgebieden.



foto: Jan Veldman



## Meehelpen aan onderzoek

### Pootring aflezen

Zie je een schoukster met één of meerdere ringen om zijn poot, geef het door! Jouw waarneming helpt bij onderzoek naar manieren om schouksters te beschermen.

> Geef het door via de app BirdRing, [www.birdring.nl](http://www.birdring.nl).

### Nestelende vogels doorgeven

Markeer een gevonden nest en probeer te volgen hoe het de kuikens vergaat. Je kunt een nest op verschillende manieren doorgeven. Vrijwilligers van de Bond Friese VogelWachten hebben het BFVW Registratie-systeem. Melden kan ook via de Boerenlandvogelmonitor en AviNest van Sovon.

### Help bij broedpalenonderzoek

Denk je dat jij een goede broedlocatie weet voor de schoukster? Plaats een broedpaal! Schakel eventueel hulp in van een lokale vogelwerkgroep. Is de broedpaal bezet, volg dan het broedsel.

> Geef je waarneming door via Protocol Schouksternesten op broedplatforms op de website van Sovon.



## Beheerwerkzaamheden

Zorg voor voldoende afwisseling van lange en korte (begraasde) vegetatie gedurende de gehele kuikenperiode.

Plan werkzaamheden gefaseerd in op percelen waar geen vogels broeden of foerageren. Zo raken de oudervogels en het nest niet verstoord of beschadigd en blijven rondlopende kuikens veilig. Let er bij schouksters op dat hun broedseizoen nogal variabel kan zijn, dus laat een deskundige controleren of er geen vogels meer aanwezig zijn.



## Verstoring door katten en honden

### Honden

Het buitengebied is een heerlijke plek om te wandelen of je eigen hond vrij te laten rondlopen. Maar honden kunnen ongemerkt een hoop schade aanrichten voor vogels. Ze kunnen nesten vernielen of zelfs opeten. Ook maken ze volwassen vogels onrustig, voor wie dat veel energie kost. Zeker in de broedtijd of tijdens ongunstige weersomstandigheden kunnen ze die energie veel beter gebruiken! Vogels kunnen gebieden waar ze herhaaldelijk verstoord worden gaan mijden, waardoor een geschikt gebied verloren gaat voor vogels. Blijf daarom op de paden en lijk je hond aan. Respecteer ook borden, wanneer die aangeven dat honden ergens niet welkom zijn.

### Katten

Katten kunnen nesten en vogels verstoren. We roepen eigenaren daarom op hun kat binnen te houden, zeker tijdens het broedseizoen. Ook zwervkatten zijn een gevaar voor schouksters. Ze kunnen zowel oudervogels als jongen doden, verwonden en verstoren. Als jager die niet van nature in Nederland voorkomt, brengen ze de natuurlijke balans in de war. Voorkom vogel- en kattenleed door je huisdier te chippen en te castreren/steriliseren. Zo kunnen zoekgeraakte katten en hun eigenaar sneller herenigd worden en groeit de populatie zwervkatten niet. Ook zwervkatten kunnen onvruchtbaar worden gemaakt.

> Kijk voor meer informatie op [www.poesindemand.nl](http://www.poesindemand.nl).

#### EXTRA INFORMATIE

Kijk voor meer tips op [vogelbescherming.nl/onze-boerenlandvogels](http://vogelbescherming.nl/onze-boerenlandvogels) en [vogelbescherming.nl/schoukster](http://vogelbescherming.nl/schoukster).